

SPECIE	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	NON TRAPIANTARE DOPO LA STESSA FAMIGLIA E...	FAVOREVOLE IL TRAPIANTO DOPO	ANNI PRIMA DI RIPETERE SULLO STESSO TERRENO	SPECIE CHE TOLLERA LA MEZZOMBRA	CONSOZIAZIONE POSSIBILE	DISTANZA TRA LE PIANTE IN CENTIMETRI	CONCIMAZIONE			RIDUZIONE PRIMA DELLA RACCOLTA	SOSPENSIONE PRIMA DELLA RACCOLTA	IRRIGAZIONE
								TRA LE FILE	SULLA FILA	ORGANICA QUANTITÀ CONSIGLIATA	IN BUCÀ CONSIGLIATA AL TRAPIANTO	MENSILE DOPO IL TRAPIANTO	
AGLIO	LIL	PATATA BIETOLA	COMPOSITE	4	X	LATTUGA - FRAGOLA CAROTA	30	15	MEDIA			X	AL TRAPIANTO E POI SETTIMANALMENTE SOLO IN CASO DI SICCITÀ
ANGURIA	CUC	CUCURBITACEE	LEGUMI COMPOSITE	4	NO	LATTUGA - CIPOLLA SEDANO	200	100	ABBONDANTE	X	X	X	ABBONDARE A INIZIO ALLEGAGIONE E INGROSSAMENTO DEI FRUTTI
ASPARAGO	LIL	PATATA CAROTA ASPARAGO	MAIS FRAGOLA	7	X	LATTUGA SPINACIO FAGIOLINO	100	30	ABBONDANTE	X			SETTIMANALMENTE NEI PERIODI ASCIUTTI
BASILICO	LAB	LABIATE	SOLANACEE	2	X	POMODORO FINOCCHIO CETRIOLI	30	20	MEDIA		X		FREQUENTE SENZA BAGNARE LE FOGLIE
BIETOLA DA COSTE	CHE	SPINACIO BIETOLE	CIPOLLA FAGIOLI	3	X	CIPOLLA RAVANELLO CAVOLI	30	25	MEDIA				FREQUENTE, SENZA RISTAGNI
BIETOLINE DA TAGLIO	CHE	SPINACIO BIETOLE	CIPOLLA FAGIOLI	3	X	CIPOLLA RAVANELLO	30	10	MEDIA		X		FREQUENTE, SENZA RISTAGNI
BIETOLA DA RADICE	CHE	SPINACIO BIETOLE	CIPOLLA FAGIOLI	3	X	CIPOLLA RAVANELLO LATTUGA	30	10	MEDIA			X	FREQUENTE, SENZA RISTAGNI, RIDURRE PRIMA DELLA RACCOLTA
CARCIOFO	COM	CARDO CARCIOFO	SOLANACEE BIETOLA	5	NO	LATTUGA SPINACIO RAVANELLO	100	100	ABBONDANTE	X			SETTIMANALMENTE, IN FASE DI PRODUZIONE, IN CASO DI SICCITÀ
CARDO	COM	CARDO CARCIOFO	SOLANACEE BIETOLA	4	NO	LATTUGA SPINACIO RAVANELLO	100	100	ABBONDANTE	X	X		FREQUENTI EVITANDO I RISTAGNI NEI PERIODI CALDI E SICCITOSI
CAROTA	OMB	OMBRELLIFERE BIETOLA	LILIACEE PATATA	3	X	CIPOLLA - PORRO LATTUGA	25	5	MEDIA	X		X	SETTIMANALE IN FASE DI INGROSSAMENTO, SENZA RISTAGNI
CAVOLI	CRU	SOLANACEE OMBRELLIFERE	LATTUGA CIPOLLA LEGUMI	2	X	FINOCCHIO SEDANO LATTUGA	50	40	ABBONDANTE	X	X	X	IRRIGAZIONI FREQUENTI CON VOLUMI NON ECCESSIVI
CAVOLO RAPA	CRU	SOLANACEE OMBRELLIFERE	LATTUGA CIPOLLA LEGUMI	2	X	BIETOLA - CIPOLLA LATTUGA	40	20	MEDIA	X		X	IRRIGAZIONI FREQUENTI CON VOLUMI NON ECCESSIVI
CECE	LEG	LEGUMINOSE		2	NO	CAVOLO - CETRIOLI FINOCCHIO	50	10	SCARSA			X	RESISTENTE ALLA SICCITÀ
CETRIOLI	CUC	CUCURBITACEE	LEGUMI	3		LATTUGA - SEDANO CIPOLLA	100	40	ABBONDANTE	X	X		IRRIGAZIONI FREQUENTI CON VOLUMI NON ECCESSIVI
CICORIE DA CESPO	COM	LATTUGA	PORRO PISELLO	3	X	FINOCCHIO LATTUGA POMODORO	40	30	MEDIA			X	ATTENDERE SEMPRE L'ASCIUGATURA DEL TERRENO
CIPOLLA	LIL	CAVOLO BIETOLA	CETRIOLI POMODORO	3	NO	LATTUGA - CAROTA PISELLO	30	15	MEDIA			X	IN CASO DI SICCITÀ SETTIMANALMENTE IN INGROSSAMENTO
CIPOLLOTTO	LIL	LILIACEE	PATATA FAGIOLI	3	X	LATTUGA - CAROTA PISELLO	30	5	MEDIA			X	ATTENDERE SEMPRE L'ASCIUGATURA DEL TERRENO
INDIVIA RICCIA E SCAROLA	COM	LATTUGA CICORIA	RAVANELLO	3	X	RAVANELLO CARCIOFO CIPOLLA	40	30	MEDIA			X	ATTENDERE SEMPRE L'ASCIUGATURA DEL TERRENO
FAGIOLI E FAGIOLINO	LEG	CUCURBITACEE BIETOLA	BROCCOLI CAVOLI	2	X	SEDANO - CAVOLI LATTUGA	50	10	SCARSA			X	IRRIGAZIONI SCARSE MA FREQUENTI
FAVA	LEG	LEGUMINOSE	BROCCOLI CAVOLI	2	NO	PATATA - LATTUGA CAVOLI	50	10	SCARSA				ESIGENZE IDRICHE LIMITATE. IRRIGARE SOLO CON SICCITÀ
FINOCCHIO	OMB	OMBRELLIFERE	LEGUMI	3	NO	LATTUGA - CAVOLO SPINACIO	40	25	ABBONDANTE	X	X	X	IRRIGAZIONI FREQUENTI EVITANDO I RISTAGNI
FRAGOLA	ROS	ROSACEE	CAVOLO	3	X	LATTUGA - CIPOLLA PREZZEMOLO	100	30	MEDIA	X		X	IRRIGAZIONI SCARSE MA FREQUENTI
LATTUGA	COM	RADICCHIO LATTUGA	SPINACIO PORRO	2	X	CIPOLLA RAVANELLO POMODORO	40	25	MEDIA				IRRIGAZIONI FREQUENTI EVITANDO I RISTAGNI
LATTUGHINI DA TAGLIO	COM	COMPOSITE	SOLANACEE BIETOLA	2	X	SEDANO - SPINACIO FINOCCHIO	30	5	MEDIA		X		IRRIGAZIONI FREQUENTI EVITANDO I RISTAGNI
MAIS DOLCE	GRA	GRAMINACEE	LEGUMI	3	NO	ZUCCA - POMODORO LATTUGA	30	50	ABBONDANTE	X	X		ALLA FORMAZIONE E INGROSSAMENTO DELLA PANNOCCHIA
MELANZANA	SOL	SOLANACEE CUCURBITACEE	CIC. LATT.	4	NO	LATTUGA FAGIOLINO CAVOLO	100	40	ABBONDANTE	X	X		TEME CARENZA E RISTAGNI. INNESTATA È MENO DELICATA
MELONE	CUC	CUCURBITACEE	LEGUMI	4	NO	LATTUGA - CAVOLO FINOCCHIO	150	80	ABBONDANTE	X	X	X	ABBONDARE A INIZIO ALLEGAGIONE E FINE INGROSSAMENTO
OKRA	MAL	MALVACEE	LEGUMI	3	NO	LATTUGA PEPERONE SEDANO	100	100	MEDIA		X		NEI PERIODI ARIDI, IRRIGAZIONI SCARSE MA FREQUENTI
PATATA	SOL	SOLANACEE	LEGUMI CAVOLI	4	X	FAVA - SPINACIO FAGIOLI - MAIS	80	30	ABBONDANTE	X	X	X	EVITARE CARENZA PRIMA E DURANTE LA FIORITURA
PEPERONE	SOL	SOLANACEE	CIC. LATT.	4	X	LATTUGA - CAVOLO FINOCCHIO	100	40	ABBONDANTE	X	X		TEME CARENZA E RISTAGNI. CONSIGLIATA BAULATURA
PISELLI	LEG	FAGIOLI	CICORIA CAVOLI	2	X	CAVOLO - CETRIOLI FINOCCHIO	50	10	SCARSA				ESIGENZE IDRICHE LIMITATE. IRRIGARE CON SICCITÀ
POMODORO	SOL	CUCURBITACEE ASPARAGO	CIC. LATT.	3	NO	LATTUGA - SEDANO PISELLO	100	40	ABBONDANTE	X	X	X	ABBONDARE NEI PERIODI SICCITOSI
PORRO	LIL	LILIACEE	CAVOLO CETRIOLI POMODORO	3	X	CAVOLO - SEDANO FINOCCHIO	30	15	ABBONDANTE	X	X	X	IRRIGAZIONI FREQUENTI EVITANDO I RISTAGNI
PREZZEMOLO	OMB	OMBRELLIFERE	LATTUGA	3	X	RAVANELLO SPINACIO - FRAGOLA	15	5	SCARSA				IRRIGAZIONI SCARSE MA FREQUENTI
RAVANELLO	CRU	CRUCIFERE	INSALATE POMODORI PORRI	2	X	PREZZEMOLO - SPINACIO LATTUGA	15	5	SCARSA			X	IRRIGAZIONI SCARSE MA FREQUENTI
RUCOLA	CRU	CRUCIFERE		2	X	PORRO - SPINACIO LATTUGA	15	5	MEDIA			X	IRRIGAZIONI FREQUENTI EVITANDO I RISTAGNI. IRRIGANDO SALTUARIAMENTE SI OTTIENE UN SAPORE PIÙ INTENSO
SCALOGNO	LIL	CAVOLO BIETOLA	CETRIOLI POMODORO	3	X	LATTUGA - CAROTA PISELLO	30	15	MEDIA			X	SETTIMANALMENTE SOLO IN CASO DI SICCITÀ
SEDANO	OMB	OMBRELLIFERE	LEGUMI	3	X	MELANZANA POMODORO PORRO	40	25	ABBONDANTE	X	X	X	IRRIGAZIONI FREQUENTI EVITANDO I RISTAGNI
SPINACIO	CHE	BIETOLA SPINACIO	CAVOLO INSALATE ZUCCHINE	2	X	FAGIOLI - CIPOLLA CARCIOFO	25	5	MEDIA				IRRIGAZIONI FREQUENTI EVITANDO I RISTAGNI
VALERIANA	VAL	VALERINACEE		2	X	LATTUGA - CICORIA PORRO	25	5	MEDIA				IRRIGAZIONI FREQUENTI EVITANDO I RISTAGNI
ZUCCA	CUC	ZUCCHINO POMODORO	LEGUMI LATTUGA	3	NO	SEDANO FINOCCHIO CAVOLO	200	100	MEDIA	X	X	X	ABBONDARE A INIZIO ALLEGAGIONE E INGROSSAMENTO DEI FRUTTI
ZUCCHINO	CUC	CUCURBIT. POMODORO	LEGUMI LATTUGA CAVOLI	3	NO	LATTUGA RAVANELLO SPINACIO	120	80	ABBONDANTE	X	X		ABBONDARE A GIORNI ALTERNI NEI PERIODI MOLTO CALDI

CONCIMAZIONE ORGANICA DI FONDO: Letame, stallatico, pollina, cornunghia ecc. si apporta principalmente nel periodo invernale, interrata con la vangatura. Se non è stata apportata prima, fornirla prima del trapianto.

CONCIMAZIONE IN BUCÀ: Guano, pollina, compost, fertilizzanti NPK ecc. possono essere collocati in buca al trapianto, non a contatto con le radici o ancora meglio 2 settimane prima.

CONCIMAZIONE DOPO IL TRAPIANTO: per le specie a ciclo lungo che amano concimazioni abbondanti per produzioni più generose è consigliabile apportare concime NPK o a base di borlana ogni 3 settimane anche durante la coltivazione.

## Orti ed aree climatiche

### COSA TRAPIANTARE E QUALE PROTEZIONE UTILIZZARE?

Nel nostro Paese ci sono 4 aree con diverse caratteristiche climatiche, che abbiamo evidenziato con diversi colori nella cartina dell'Italia. Individuato il colore della vostra zona, cercate sul calendario, nel mese che vi interessa, sotto quali specie c'è il bollino dello stesso colore. Si tratta degli ortaggi che si possono trapiantare nella vostra zona in quel mese. Nel bollino c'è una lettera che, come indicato nella leggenda, suggerisce il tipo di protezione per quell'ortaggio, al momento del trapianto. Si prendano questi suggerimenti con elasticità, considerando l'esposizione del proprio orto, l'andamento stagionale e l'esperienza passata.

LEGENDA SIMBOLOGIE	
SP	Senza protezione
TNT	Tessuto non tessuto bianco
TP	Telo plastico trasparente
P	Pacciamatura con paglia
F	Fasciatura
R	Rincalzatura del terreno
L	Legatura con elastico

ZONE MONTANE      PIANURA PADANA  
LIGURIA - CENTRO ITALIA      SUD - ISOLE

